Zaszczep psa

Dane jakimi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna w Końskich wskazują, że nasz powiat znajduje się w obszarze, w którym zlokalizowano zwierzęta podejrzane o wściekliznę. Stwierdzono, iż według statystyk na rok 2019, w powiacie koneckim liczba psów zarejestrowanych jako zaszczepione przeciwko wściekliźnie wynosiła 9755, co znacznie odbiega od rzeczywistej liczby 14516 psów utrzymywanych na terenie powiatu. Oznacza to 67% skuteczność szczepień na naszym terenie. Taki wynik świadczy o bardzo niskiej świadomości społecznej związanej z ryzykiem zakażenia tą nieuleczalną, odzwierzęcą chorobą, brakiem leku przeciwko wściekliźnie oraz możliwością przenoszenia się jej na człowieka.

Działania Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu uświadomienie właścicielom czworonogów, iż jedynym skutecznym narzędziem walki z tą chorobą jest zapobieganie szerzeniu się wścieklizny poprzez szczepienia, w tym szczepienia psów narażonych na kontakt z dzikimi zwierzętami takimi jak lisy.

Wirus wścieklizny

Chorobą wywołuje wirus z rodzaju Lyssavirus, z rodziny Rhabdoviridae. Jest to zarazek wrażliwy w środowisku zewnętrznym - w wysuszonej ślinie ginie w ciągu kilku godzin. W niskich temperaturach może przetrwać w tkankach kilka dni, natomiast w temperaturze pokojowej ginie w zwłokach po około dobie Szybko niszczy go nie tylko podwyższona temperatura ale taż promieniowanie słoneczne. Wirus ten jest również wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne [ługi, kwasy formalinę, czwartorzędowo zasady amoniowe. Itp) a także w dużym stopniu na detergenty i mydło.

Objawy u zwierząt

Pierwsze stadium choroby (tzw. zwiastunowe) trwa od kilku godzin do 3 dni. Zwierzę przestaje jeść i pić oraz zmienia sią jego zachowanie. Zwierzęta dotychczas płochliwe garną się do ludzi, a uprzednio ufne stają się lękliwe i chowają się w ciemne kąty. Częsty jest niepokój, chęć ucieczki z domu, warczenie czy szczekanie „bez powodu". Wiele psów odczuwa świąd w miejscu pokąsania i liże lub gryzie tę okolicę. Źrenice nierzadko są rozszerzona a temperatura ciała podwyższona.

Drugie stadium choroby to okres pobudzenia trwający 1-7 dni zwierzę ma wystraszone spojrzenie z rozszerzonymi [często nierówno] źrenicami, Jest niespokojne, w bezustannym ruchu, agresywne, połykać może kamienie oraz inne niejadalne przedmioty. Narasta tendencja do kąsania. Zwierzę może gryźć pręty klatki, nawet wyłamując zęby. Pojawia się ślinotok, nieuzasadnione bieganie oraz ochrypłe szczekanie. Zanika strach przed naturalnymi wrogami. Atakują inne zwierzęta, ludzi tub nawet obiekty nieożywione. Ujawniają się zaburzenia koordynacji ruchów, orientacji lub napady drgawek.

Trzecie stadium choroby to okres trwający do 3-4 dni. Niepokój przechodzi stopniowo w wyczerpanie. Zwierzę traci na agresywności i przy postępujących porażeniach narządów dochodzi do niewydolności oddechowej, śpiączki i agonii, co ma miejsce w ciągu 2-14 dni od wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Opisane stadia wścieklizny przechodzą płynnie jedno w drugie.